



Paziente: *Nala, labrador retriever femmina di 30 mesi, sterilizzata, 32kg di peso*

Nala è stata portata a visita clinica all'età di 15 mesi per una importante difficoltà deambulatoria a carico degli arti anteriori, zoppie intermittenti interessanti a volte l'arto anteriore destro, a volte il sinistro, apatia e tendenza a stare quasi sempre in decubito nonostante la giovane età.

Non è mai stato eseguito uno studio radiografico giovanile in quanto sconsigliato dall'allevatore.

Alla visita clinica entrambi i gomiti si presentavano estremamente reattivi, dolenti alla palpazione con rom articolare notevolmente ridotto.

Lo studio radiografico eseguito in sedazione mostrava una gravissima osteoartrite bilaterale ai gomiti, con evidente rimaneggiamento osseo e presenza di osteofiti, secondaria a grave displasia.

Vista l'età del paziente e la condizione articolare, abbiamo optato per un approccio conservativo multimodale: infiltrazione intrarticolare con concentrato piastrinico (Vpet della Candioli), fisioterapia (Fisioterapet, Osimo) e somministrazione di condroprotettori e acidi grassi.

A distanza di 6 mesi è stata eseguita una seconda infiltrazione.

Ad oggi Nala conduce un'attività fisica giudicata "normale" dalla proprietaria, è attiva e non presenta difficoltà deambulatorie se non una lieve zoppia "a freddo" solo nei primi passi. Non fa uso di Fans.